


# เมื่อถูกสุนัข กัด ข่วน เลียบาดแผล ต้องรีบ

 ล้างแผล ด้วยสบู่และ น้ำสะอาดอย่างเบาๆ หลายๆ ครั้ง

 ใส่ยา เบตาดีน

 กักหมา ไว้ดูอาการ 10 วัน

 หาหมอ เพื่อรับการป้องกัน ที่ถูกต้อง และมาตามนัดทุกครั้ง

**ถูกสุนัขกัด  
ต้องล้างแผล ใส่ยา  
กักหมา หาหมอ  
ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด**

# คำแนะนำ สำหรับคนเลี้ยงสุนัขและแมว

**ฉีดวัคซีน** ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

**ทำหมัน** ไม่ให้ มีลูกมากเกินไป

เลี้ยงในรั้วบ้าน **ระวัง!** อย่าให้ ไปกัดคนอื่น

## กาา 5 ย กับสุนัขกัด

-  **อย่า แหย่** ให้สุนัขโมโห
-  **อย่า เขี่ย** หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
-  **อย่า แยก** สุนัขที่กัดกัน ด้วยมือเปล่า
-  **อย่า หยิบ** อาหารที่สุนัข กำลังกิน

 **อย่า ยุ่ง** กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ



**โรคพิษสุนัขบ้าอันตรายถึงตาย หากไม่ได้ฉีดวัคซีน**





# โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
เกิดจากเชื้อเรบีส์ไวรัส เป็นได้  
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด



**แต่ !!**

สัตว์นำโรคที่สำคัญ คือ



สุนัข



แมว



## กลุ่มเสี่ยง

คนที่ถูกหมากัด ข่วน  
เลียบาดแผล แล้ว**ไม่ไป**  
ฉีดวัคซีน



## การติดต่อ

ถูกสัตว์ที่มีเชื้อ **กัด ข่วน เลียบาดแผล**



## ดูอย่างไร ว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะเริ่มแรก



นิสัยเปลี่ยน ไม่ร่าเริง หงุดหงิด  
เก็บตัว หวาดระแวง



ระยะตื่นเต้น



กระวนกระวาย กัดไม่เลือก  
เห่าหอน



ระยะอัมพาต



น้ำลายไหล คางห้อยตก  
ล้มลง ตาย




## ความรู้ที่มักเข้าใจผิด



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข มักไม่เป็น  
โรคพิษสุนัขบ้า



สุนัขที่มีเจ้าของหรือลูกสุนัข หากไม่ได้  
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ก็เป็นบ้าได้



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้เฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นได้ทุกฤดู



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
รักษาให้หายได้



โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อมีอาการแล้ว  
“รักษาไม่หาย ตายทุกราย”